


n

n<sup>o</sup>. 665. agave . . . . . maguay de cocuy (différent du maguay de cocuira ou ne mange pas les feuilles ni boit la liqueur fermentée) Cet agave diffère mutuellement du genre genre par la forme et longueur des étamines. Cal. o. cor. infund. 6-partita, laciniis lanceolato-ovatis ex albo viridibus, interioribus latioribus. Stam. 6. corolla  $\frac{1}{2}$  breviora, basi dilatata, medio incrassata ancipitia apice subulata. germina triquetra (quali germina tria coacta) tricolata. Styl. 1. triquetra staminibus longior, petalis paulo brevior: stigma capitatum, sub tripartitum. Serrula 30-40. pedalis ramosa, ramis ~~terribus~~ alternis, floribus pedunculatis alternis (sed tribus floribus ex uno centro nascentibus) caule tereti, folia ensiformia, lanceolata dentato pinnata, pinnis geminis cuneatis, altera dextrorsum, altera sinistrorsum reflexis. flores laxi pedunculi pallide lactei.



Furcata  
stam. non ex-  
serta stigma  
sub trilobum

Agave americana  
stam. exserta  
stigma trifid.  
vel Ag. carib.  
Lacq.

Le vrai maguay ou maguay de cocuira est foliis ensiformibus strictis, erectis, junioribus integerrimis, senioribus adultioribus spinoso-dentatis, pinnis omnibus recurvatis simplicibus, floribus corymbosis, arcte aggregatis erectis, ex lacteo fulvescentibus.

n<sup>o</sup>. 5098. agave americana. (employé au Mexique pour faire le pulqué.) Cal. o. Corolla 6-partita, laciniis lanceolato-lanceolatis, erectis, marginibus et presertim basi membranaceis apice craticulatis. Stam. 6. corolla duplo longiora, anthera versatiles oblongae. ovarium oblongum ~~oblongum~~ oblongum triquetrum Styl. 1. staminibus paulo longior stigma subtrigonum. Capsula oblonga tripollicaris longa, triquetra, trilobulari polysperma.



